

Plaag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel. nr.	Groep	Spuiten per 100 liter	LVM/fog per 1.000 m ²	Opmerkingen	Hommel	Nawerking Hommels	Wachttijd in dagen	
Insecticiden en acariciden											
Bladluis	Calypso	thiacloprid	12452 N	4	25 ml		max. 2x per seizoen, 0,25l per ha in vollegrond	B	24 uur	1-3	
	Pirimor	pirimicarb	5794 N	1a	50 gr		werkt niet tegen alle soorten luizen	B	24 uur	7	
	Pirimor rook	pirimicarb	5793 N	1a	1 st 700m ³		werkt niet tegen katoenluis	B	24 uur	7-14	
	Spruzit vlb.	pyrethrinen+piperonylbutoxide	7229 N	3	100 ml		tegen luis, trips, wants, rups, kever	B	24 uur	2	
Rups	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	20 ml		werkt ook tegen aardbeibloesemkever	B	72 uur	4	
	Tracer	spinosad	12567 N	5	20 ml		Alleen bedekte teelt. Bijen en hommels: zie etiket	B	24 uur	1	
	XenTari	<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>	12437 N	11	1 kg/ha		temp. boven de 15 graden	A	-	7	
Witte vlieg	Botanigard WP	<i>Beauveria bassiana</i>	12612 N	-	62,5 gr		alleen onder glas	B	16 uur	n.v.o.	
	Calypso	thiacloprid	12452 N	4	25 ml		werkt ook tegen aardbeibloesemkever	B	24 uur	1-3	
	Oberon	spiromesifen	12588 N	23	50 ml		Alleen bedekte teelt. 2x per seizoen.	A	-	n.v.o.	
Trips	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	20 ml		werkt ook tegen aardbeibloesemkever	B	72 uur	4	
	Tracer	spinosad	12567 N	5	20 ml		Alleen bedekte teelt. Bijen en hommels: zie etiket	B	24 uur	1	
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml		max. 3x per teelt	B	72 uur	3	
Spint	Apollo	chlofentezin	8794 N	10a	30 ml		tot opgaan eerste bloem of na laatste pluk	B	36 uur	n.v.t.	
	Cantack	acequinocyl	12939 N	20b	100 ml		alleen op vermeerderingsvelden	B	24 uur	n.v.t.	
	Envidor	spirodichlofen	12477 N	23	40 ml		max. 2x per teelt	A	-	3	
	Floramite	bifenazaat	12421 N	25	40 ml		max. 1x per teelt	B	48 uur	1	
	Milbeknock	milbemectine	12364 N	6	50 ml		alleen in vermeerdering en buitenteelt tot bloei en na pluk	B	72 uur	n.v.t.	
	Nissorun spp	hexythiazox	9704 N	10a	50 gr		trage aanvangswerk. werkt tegen ei- en nimfenstadia	B	12 uur	3	
	Oberon	spiromesifen	12588 N	23	50 ml		toepassen uiterlijk tot 2 weken voor eerste bloemknoppen	A	-	n.v.o.	
	Torque L	fenbutatinoxide	7037 N	12	45 ml		tot opgaan bloem, na laatste pluk in niet grondg. teelt	A	-	n.v.t.	
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml		max. 3x per teelt	B	72 uur	3	
	Taxuskever	Bio 1020	<i>Metarhizium anisopliae</i>	12589 N	-	0,5 kg/m ³		temp. moet tussen 15 en 30 graden voor goede werking	A	-	n.v.t.
Fungiciden											
Meeldauw	Enzicur	kaliumpjodide+kaliom	12940 N	-	150 gr		gewas moet tenminste 20 min. nat zijn na toepassing	A	-	n.v.o.	
	Flint	trifloxystrobin	12289 N	C	12,5 gr		eerst proefbespuiting, max 3x / teelt, na 7-10 dgn herhalen	A	-	3	
	Frupica SC	mepanipirim	12229 N	D	0,9 l/ha		max. 2x per teelt, onder glas en buitenteelt	A	-	3	
	Nimrod	buperimaat	6834 N	A2	1 l/ha		alleen in vollegrond, max. 3x per seizoen	A	-	3	
	Stroby WG	kresoxim-methyl	11818 N	C	30 gr		max. 3x toepassen per teelt	A	-	7	
	Kumulus-S	zwavel 80%	6147 N	-	400 gr		voor en na de oogst toepassen, niet onder glas	A	-	n.v.o.	
	Topaz 100 EC	penconazool	9364 N	G1	0,5 l/ha		max. 4x per teelt. Niet onder lichtarme omstandigheden	B	12 uur	3	
	Thiovit Jet	zwavel 80%	5395 N	-	400 gr		voor en na de oogst toepassen, niet onder glas	A	-	n.v.o.	
	Botrytis	Frupica SC	mepanipirim	12229 N	D	0,9 l/ha		max. 2x per teelt, onder glas en buitenteelt	A	-	3
		Malvin WG	captan 80%	6782 N	-	150 gr		onder glas max. 2x per teelt, tot 14 dgn voor eerste pluk	A	-	4
Merpan WG		captan 80%	11462 N	-	150 gr		onder glas max. 2x per teelt, tot 14 dgn voor eerste pluk	A	-	4	
Rovral aquaflo		iprodion	8928 N	F1	1,5 l/ha		max. 4x per teelt	A	-	2	
Signum		pyraclostrobin+boscalid	12630 N	C3	1,8 kg/ha		onder glas+buitenteelt	A	-	1	
Switch		fludioxonil+cyprodinil	12819 N	-	100 gr		max. 3x per teelt	B	12 uur	1	
Teldor		fenhexamide	12130 N	G3	100 gr		buitenteelt 1,5 kg/ha	A	-	1	
Thiram Granuflow		thiram	10172 N	M3	200-250 gr		toepassen totdat eerste bloem open gaan	A	-	14	
Rhizoctonia		Rovral aquaflo	iprodion	8928 N	F1	2,0 l/ha		max. 2x per teelt	A	-	2
Stengelbasisrot (Phytophthora)		Aliette	fosethyl-aluminium	11561 N	U	750 gr		ook roodwortelrot	B	48 uur	14
	Fenomenal	fenamidone & fosetyl-aluminium	12824 N	C / U			Alleen onbedekte teelt. Dompelbeh.: voor uitplanten in oplossing 150 g / 100L Aangietbeh.: per plant 100 ml van oplossing 75 g / 100L	B	-	35	
	Paraat	dimethomorph	11432 N	H	3 kg/ha		onder glas 0,1 gr / plant in 100 ml water druppelen	B	24 uur	35	
Onkruid											
	Fenmedifam	fenmedifam	9390 N		6 l/ha		alleen vollegrond, voor bloei of na oogst/uitplanten	A	-	n.v.t.	
	Fusilade Max	fluazifop-p butyl	12519 N		1-3 l/ha		toegestaan van 1 apr tot 30sept, alleen voor de bloei	A	-	42	
	Pilot	quizalofop-p ethyl	12279 N		1 l/ha		geen uitvloeier toepassen, alleen voor bloei	A	-	21	
	Targa Prestige	quizalofop-p ethyl	11155 N		1 l/ha		geen uitvloeier toepassen, alleen voor bloei	A	-	21	
	Dual Gold 960 EC	S-metolachloor	12096 N		0,7 l/ha		vollegrond, wachtbed, productieveld	A	-	28	

n.v.o. = niet op dag, voor de oogst

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld.

Indeling insecticiden :

- 1a) carbamaten
- 1b) organische fosforverbindingen
- 2) fipronil
- 3) pyrethroiden
- 4) neonicotinen
- 5) spinosad
- 6) avermectinen
- 7) pyriproxyfen
- 9) pymetrozinen
- 10) thiazolidines
- 11) bacillus thuringiensis
- 12) organische tinverbindingen
- 15) pyrazool verbindingen
- 16) thiaziazinen
- 17) triazinen
- 18) diacylhydrozinen
- 21) pyridazine verbindingen
- 23) ketoenolen
- 26) azadirachtinen
- 28) phthalic acid diamides

Indeling fungiciden

- A) xylilalanine verbindingen
- B) benzimidazolen
- C) strobilurinen
- D) anilino-pyrimidinen
- F1) dicarboximiden
- F3) thiaziazool verbindingen
- F4) carbamaten
- G1) triazolen
- G2) morfolines
- G3) hydroxyanilide verbindingen
- H) cinmamic zuren
- M3) dithiocarbamaten
- M5) benzotriolen
- M6) sulfamide verbindingen
- U) fosfonaten

A :gaat samen S :kast dichtdoen tot gewas groog is B :nest voor toepassing verwijderen C :gaat niet samen D :niet bekend

Neveneffect op natuurlijke bestrijders

- inzetbaar in geïntegreerde teelt
- Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders
- Niet te combineren met natuurlijke bestrijders

Voor de beste combinatie van chemische met biologische bestrijding kunt u contact opnemen met uw specialist gewasbescherming

Honselersdijk:
 Emmen Arend-Sosef BV - 0174 - 630214
 Venlo - Huissen Arend-Sosef BV - 0174 - 630214
 Arend-Sosef BV - 077 - 4722557

U kunt uw vragen ook mailen naar: biologie@arendsosef.nl

- * Lees voor het gebruik altijd het etiket op de verpakking
- * Alle informatie op deze lijst is bedoeld als advies.
- * Omdat de toepassing buiten onze controle gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen
- * Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade lijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie
- * Het is niet toegestaan zonder toestemming van Arend-Sosef BV deze lijst of gegevens uit deze lijst te verspreiden